

สารระเหย



กองป้องกันและบำบัดการติดเชื้อและพิษวิทยา
สภากาชาด กทม. โทร 0 2245 7804, 0 2248 5746

พระราชกำหนดป้องกันสารระเหย พ.ศ. 2533

ความผิด	อัตราโทษ
<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขายไม่จัดให้มีภาพเครื่องหมายหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหยเพื่อเป็นการเตือนให้ระวังการใช้สารระเหย (ม.12, ม.13, และ ม.14) - จัดหาหรือให้สารระเหยแก่ผู้ซึ่งคนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นผู้คิดสารระเหย (ม.16) - ใช้สารระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าจะโดยวิธีสูดดม หรือวิธีอื่นใด (ม.17) - จูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม หรือใช้ลอบขายหลอกลวงให้ผู้อื่นใช้สารระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ (ม.18) 	<ul style="list-style-type: none"> - จำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.22 หรือ ม.24)
<ul style="list-style-type: none"> - ขายแก่ผู้ที่มีอายุไม่เกินสิบเจ็ดปี ยกเว้นการขายโดยสถานศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน (ม.15) 	<ul style="list-style-type: none"> - จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.23)

เมื่อคิดสารระเหย จะทำอย่างไร?

ปรึกษาแพทย์ หรือขอรับการบำบัดรักษาได้ที่
คลินิกยาเสพติด สำนักอนามัย

- คลินิกบำบัดยาเสพติด 1 วัฒนาดุทอง โทร. 0 2391 8539
- คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว โทร. 0 2513 2509
- คลินิกยาเสพติด ศูนย์ 3 บางซื่อ โทร. 0 2586 7826
- คลินิกยาเสพติด ศูนย์ 4 ดินแดง โทร. 0 2245 0640
- คลินิกยาเสพติด ศูนย์ 6 อิมรอนธรรมทิว โทร. 0 2281 9730
- คลินิกยาเสพติด ศูนย์ 7 บุญมี ปุทราธรรมา โทร. 0 2295 5128
- คลินิกยาเสพติด ศูนย์ 16 ลุมพินี โทร. 0 2252 0775
- คลินิกยาเสพติด ศูนย์ 19 วงศ์สว่าง โทร. 0 2587 9450
- คลินิกยาเสพติด ศูนย์ 22 วัดปากบ่อ โทร. 0 2321 2566
- คลินิกยาเสพติด ศูนย์ 23 สีพระยา โทร. 0 2236 4174
- คลินิกยาเสพติด ศูนย์ 29 ช่วง นุชนคร โทร. 0 2468 0705
- คลินิกยาเสพติด ศูนย์ 31 เอ็ม-จิตร ทั้งสุบุตร โทร. 0 2424 3236
- คลินิกยาเสพติด ศูนย์ 40 บางแค โทร. 0 2413 2435
- คลินิกยาเสพติด ศูนย์ 41 คลองเตย โทร. 0 2249 1852
- คลินิกยาเสพติด ศูนย์ 51 วัดไผ่ตัน โทร. 0 2278 0013
- ศูนย์ จิต สังคม บำบัด โทร. 0 2254 2039

• ศูนย์รับน้ำตา สำนักงานแพทย์

- โรงพยาบาลตากสิน โทร. 0 2437 2295
- วชิรพยาบาล โทร. 0 2241 4809

หรือ

ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งของกรุงเทพมหานคร

สารระเหย



สารระเหย (VOLATILE SOLVENT)

เป็นสารเคมีที่ระเหยได้ง่าย ใช้ในการอุตสาหกรรม ได้แก่ ทินเนอร์ แลคเกอร์ กาว เป็นต้น

เด็กและเยาวชนจำนวนมากมักใช้สารระเหยในทางที่ผิดโดยนำมาสูดดมจนเกิดการเสพติด เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รัฐบาลได้แก้ปัญหานี้ โดยออกกฎหมายเป็นพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ซึ่งมีบทกำหนดโทษผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย และผู้ใช้สารระเหยเพื่อบำบัดความต้องการของร่างกายและจิตใจ

ร่างกายมีค่า อย่าทำลายด้วยสารระเหย!

เมื่อสูดดมสารระเหยเข้าไปสูดปอดแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างรวดเร็ว ทำลายระบบต่างๆ และอวัยวะที่สำคัญ เช่น สมอง หัวใจ ปอด ตับ ไต เป็นต้น สารพิษบางส่วนจะถูกกำจัดออกมทางปอด จึงมักได้กลิ่นสารระเหยจากลมหายใจ

พิษเฉียบพลัน

ภายหลังการสูดดมสารระเหย จะเกิดอาการตื่นเต้น หัวใจเต้นเร็ว คอมา มีอาการมึนงงคล้ายคนเมาสุรา ควบคุมตนเองไม่ได้ ระคายเคืองเยื่อในปากและจมูก น้ำลายไหล คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม หมดสติ อาจกลืนสารพิษลงท้องทำให้ตาช้ำได้ ทั้งนี้อาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารระเหยที่สูดดม

พิษเรื้อรัง

การสูดดมติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้มีอาการต่างๆ ในร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ กดการทำงาน ของไขกระดูก ทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว เนื้อปอดอักเสบ กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย ไม่มีแรง การทำงานของตับและไตล้มเหลว

สารระเหย เป็นสิ่งเสพติดที่มีความร้ายแรงกว่าสารเสพติดประเภทอื่น เพราะนอกจากเสพติดง่ายแล้วยังก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ โดยเฉพาะโรคสมองฝ่อถาวร ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิธีการใด ๆ ที่จะรักษาโรคสมองฝ่อให้หายเป็นปกติ

การป้องกันตนเองจากสารระเหย

- หากความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของสารระเหย
- รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ประพฤติดี มีคุณธรรม กบเพื่อนดี มีจิตใจเข้มแข็ง
- อย่าให้สารระเหยเข้าสู่ร่างกาย โดยทางหายใจ หรือทางผิวหนัง
- หากต้องทำงานเกี่ยวข้องกับสารระเหย ควรใช้ด้วยความระมัดระวังและถูกต้องตามคำแนะนำที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ เช่น สวมหน้ากาก หรือใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก และสวมเสื้อผ้าปกคลุมให้มิดชิด เป็นต้น
- ขณะใช้สารระเหย ควรอยู่นอกลมในที่อากาศถ่ายเทสะดวก

